DISCRETE DISTRIBUTIONS							
	RANGE $\mathbb{X}$	PARAMETERS	MASS FUNCTION f_X	CDF F_X	$\mathrm{E}_{f_X}[X]$	$\mathrm{Var}_{f_X}[X]$	MGF M_X
$Bernoulli(\theta)$	$\{0,1\}$	$\theta \in (0,1)$	$\theta^x(1-\theta)^{1-x}$		θ	$\theta(1-\theta)$	$1-\theta+\theta e^t$
$Binomial(n,\theta)$	$\{0,1,...,n\}$	$n \in \mathbb{Z}^+, \theta \in (0,1)$	$\binom{n}{x}\theta^x(1-\theta)^{n-x}$		$n\theta$	$n\theta(1-\theta)$	$(1-\theta+\theta e^t)^n$
$Poisson(\lambda)$	$\{0,1,2,...\}$	$\lambda \in \mathbb{R}^+$	$\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$		λ	λ	$\exp\{\lambda(e^t-1)\}$
$Geometric(\theta)$	$\{1,2,...\}$	$\theta \in (0,1)$	$(1-\theta)^{x-1}\theta$	$1-(1-\theta)^x$	$\frac{1}{\theta}$	$\frac{(1-\theta)}{\theta^2}$	$\frac{\theta e^t}{1-e^t(1-\theta)}$
$NegBinomial(n,\theta)$	$\{n,n+1,...\}$	$n \in \mathbb{Z}^+, \theta \in (0,1)$	$\binom{x-1}{n-1}\theta^n(1-\theta)^{x-n}$		$\frac{n}{\theta}$	$\frac{n(1-\theta)}{\theta^2}$	$\left(\frac{\theta e^t}{1-e^t(1-\theta)}\right)^n$
or	$\{0,1,2,...\}$	$n \in \mathbb{Z}^+, \theta \in (0,1)$	$\binom{n+x-1}{x}\theta^n(1-\theta)^x$		$\frac{n(1-\theta)}{\theta}$	$\frac{n(1-\theta)}{\theta^2}$	$\left(\frac{\theta}{1-e^t(1-\theta)}\right)^n$

For **CONTINUOUS** distributions (see over), define the **GAMMA FUNCTION**

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx$$

and the LOCATION/SCALE transformation $Y = \mu + \sigma X$ gives

$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)\frac{1}{\sigma} \qquad F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) \qquad M_Y(t) = e^{\mu t}M_X(\sigma t) \qquad \mathrm{E}_{f_Y}[Y] = \mu + \sigma\mathrm{E}_{f_X}[X] \qquad \mathrm{Var}_{f_Y}[Y] = \sigma^2\mathrm{Var}_{f_X}[X]$$

CONTINUOUS DISTRIBUTIONS

	RANGE $\mathbb{X}$	PARAMETERS	PDF f_X	CDF F_X	$\mathrm{E}_{f_X}[X]$	$\mathrm{Var}_{f_X}[X]$	MGF M_X
$Uniform(\alpha,\beta)$ (standard model $\alpha=0,\beta=1$)	(α,β)	$\alpha<\beta\in\mathbb{R}$	$\frac{1}{\beta-\alpha}$	$\frac{x-\alpha}{\beta-\alpha}$	$\frac{(\alpha+\beta)}{2}$	$\frac{(\beta-\alpha)^2}{12}$	$\frac{e^{\beta t}-e^{\alpha t}}{t(\beta-\alpha)}$
$Exponential(\lambda)$ (standard model $\lambda=1$)	$\mathbb{R}^+$	$\lambda\in\mathbb{R}^+$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1-e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)$
$Gamma(\alpha,\beta)$ (standard model $\beta=1$)	$\mathbb{R}^+$	$\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+$	$\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}$		$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$	$\left(\frac{\beta}{\beta-t}\right)^\alpha$
$Weibull(\alpha,\beta)$ (standard model $\beta=1$)	$\mathbb{R}^+$	$\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+$	$\alpha\beta x^{\alpha-1}e^{-\beta x^\alpha}$	$1-e^{-\beta x^\alpha}$	$\frac{\Gamma\left(1+\alpha^{-1}\right)}{\beta^{1/\alpha}}$	$\frac{\Gamma\left(1+2\alpha^{-1}\right)-\Gamma\left(1+\alpha^{-1}\right)^2}{\beta^{2/\alpha}}$	
$Normal(\mu,\sigma^2)$ (standard model $\mu=0,\sigma=1$)	$\mathbb{R}$	$\mu\in\mathbb{R},\sigma\in\mathbb{R}^+$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$		μ	σ^2	$\exp\left\{\mu t+\frac{\sigma^2t^2}{2}\right\}$
$Student(\nu)$	$\mathbb{R}$	$\nu\in\mathbb{R}^+$	$\frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)\sqrt{\pi\nu}\left\{1+\frac{x^2}{\nu}\right\}^{(\nu+1)/2}}$		$0\quad(\text{if }\nu>1)$	$\frac{\nu}{\nu-2}\quad(\text{if }\nu>2)$	
$Pareto(\theta,\alpha)$	$\mathbb{R}^+$	$\theta,\alpha\in\mathbb{R}^+$	$\frac{\alpha\theta^\alpha}{(\theta+x)^{\alpha+1}}$	$1-\left(\frac{\theta}{\theta+x}\right)^\alpha$	$\frac{\theta}{\alpha-1}$ (if $\alpha>1$)	$\frac{\alpha\theta^2}{(\alpha-1)(\alpha-2)}$ (if $\alpha>2$)	
$Beta(\alpha,\beta)$	$(0,1)$	$\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+$	$\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$		$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	